


Folicur Solo 250 EW

Bayer CropScience

Conținut substanță activă: tebuconazol 250 g/l
Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor la sâmburoase, măr, viță de vie și rapiță



Fungicide

Cultura	Spectru de combatere	Doză	Timp de pauză
Viță de vie	Făinare (<i>Uncinula necator</i>)	0,4 l/ha	35 de zile
Măr	Făinare (<i>Podosphaera leucotricha</i>) Rapăn (<i>Venturia inaequalis</i>)	0,05% (0,75 l/ha)	-
Sâmburoase	Monilioze (<i>Monilinia spp.</i>)	0,075% - 0,1%	14 zile
Rapiță de toamnă	Putregai alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Pătare brună (<i>Alternaria brassicae</i>) Făinare (<i>Erysiphe communis</i>)	1 l/ha (primăvara până la înflorit)	30 de zile
	Creșterea rezistenței plantelor la iernare și combaterea patogenului <i>Phoma lingam</i>	0,5 l/ha (un tratament aplicat toamna)	

Folicur Solo 250 EW este un fungicid cu spectru larg de acțiune, fiind absorbit rapid în plantă și translocat sistemic.

El inhibă dezvoltarea patogenilor, având efect preventiv, curativ și uneori eradicativ .

Recomandări de aplicare

Viță de vie: se recomandă a se utiliza pentru cel mult 3 tratamente efectuate atât înainte cât și după înflorit (primul la faza 3 frunzulițe nepliate iar celelalte în intervalul inflorescențe clar vizibile până la începutul colorării boabelor).

Măr: tratamentele se efectuează postfloral după scuturarea petalelor, 1-2 tratamente la interval de 7-12 zile, la avertizare.

Sâmburoase: se efectuează două tratamente: primul tratament se poate aplica începând cu faza de buton alb până la faza sfârșitul înfloritului iar al doilea din faza căderea petalelor până în faza de intrare în pârgă. Timp de pauză 7 zile. Pentru monilioza pe fructe tratamentul se face la avertizare (creșterea fructelor până la pârgă), la interval de 12-14 zile. Nu se vor aplica mai mult de 3 tratamente pe sezon.

Rapiță de toamnă: se aplică la avertizare primăvara până la înflorit.

Tratamentul de toamnă asigură pe lângă protecția culturii față de boli (inclusiv *Phomalingam*) și creșterea rezistenței la iernare și la cădere. Doza la tratamentul în toamnă este de 0,5 l/ha, aplicat în faza de 4-6 frunze ale culturii.

Folicur Solo 250 EW este oferit la ambalaje de 100 ml, 1 și 5 l.